

VACCINATIONSREAKTIONER

Så hanterar du symtom efter vaccination

Vanliga symtom efter vaccinering mot covid-19 är lokal ömhet i armen, muskelvärk, huvudvärk och feberkänsla. Symtom kommer oftast inom ett dygn efter vaccinering och är snabbt övergående. I många fall kan det vara svårt att skilja symtomen från en tidig covid-19-infektion.

Så här gör du vid olika symtom efter vaccination:

1. Vid enbart lokala reaktioner, lindrig muskelvärk eller huvudvärk – arbeta som vanligt.
2. Vid sjukdomskänsla med svår muskelvärk, huvudvärk eller feber ska du stanna hemma. Om symtomen försvinner inom ett dygn behöver du inte provta dig, men ska stanna hemma ytterligare ett dygn för att säkerställa att besvären verkligen är tillfälliga.

Punkt 2 gäller under förutsättning att:

- a. symtom kommit inom ett dygn efter vaccinering
- b. du inte exponerats för covid-19 (utan skyddsutrustning) de senaste 7 dagarna samt
- c. frånvaro av luftvägssymtom/halsont/nedsatt smak och lukt.

Vid kvarstående symtom mer än ett dygn – provtagning via 1177.se och avvakta provsvar hemma.

Du som haft PCR- eller antigenverifierad covid-19 inom sex månader från vaccinationen behöver inte provtas, men ska stanna hemma tills du är helt symtomfri.

1177 Vårdguiden – om din hälsa och vård

Besök [1177.se](https://www.1177.se)
eller ring 1177 för
sjukvårdsrådgivning.
Öppet dygnet runt.