Lathund vid vård av patienter med ESBL-bildande *E coli* och *Klebsiella* samt ESBLcarba

	ESBL-bildande *E coli*						**ESBL-bildande *Klebsiella***	**ESBLcarba**
	Utan riskfaktorer	Urinavledning (exempelvis KAD, intermittent katetrisering, suprapubisk kateter, nefrostomi), drän[6]	Diarré	Stomi	Sår (vätskande)	Uttalad urin- och eller faeces-inkontinens		
Patientens handhygien[1]	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Enkelrum	Nej	Nej	Ja	Nej[2]	Nej[3]	Ja	Ja	Ja
Egen toalett	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej[3]	Ja	Ja	Ja
Ta mat själv	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Äta i matsal	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja[3]	Ja	Nej	Nej
Gå i korridor	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja[3]	Ja	Nej	Nej
Vistas i dagrum	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja[3]	Ja	Nej	Nej
Träningslokal	Ja[4]	Ja[4]	Nej	Ja[2, 4]	Ja[3, 4]	Ja[4]	Ja[5]	Ja[5]

1 Patienten är informerad om att sköta sin handhygien, muntligt och skriftligt

2 Under förutsättning att stomin är välfungerande

3 Under förutsättning att såren är täckta med förband och att förbandet är synligt torrt på utsidan

4 Delta i gruppträning

5 Enskild träning

6 KAD och drän ska bäras under kläderna