

Restnotering Imovane och Zopiklon

Läkemedel (substans)	Imovane (<i>zopiklon</i>) och generika (alla leverantörer) 5 mg samt 7,5 mg
Orsak	Imovane – produktionsproblem pga. flytt av tillverkning Generiskt zopiklon – oklart (<i>troligen på grund av ökad efterfråga</i>)
Förväntat datum tillgänglighet	Imovane 5 mg 10 st + 30 st: preliminärt 19/4 Imovane 5 mg 100 st: preliminärt 15/5 Zopiklon 5 mg (alla förpackningar) slut/begränsad tillgång: preliminärt april Imovane 7,5 mg alla förpackningar: preliminärt 8/3 Zopiklon 7,5 mg 10 st begränsad tillgång: preliminärt april Zopiklon 7,5 mg 30 st slut: preliminärt april Zopiklon 7,5 mg 100 st tillgängliga
Konsekvens	I dagsläget är det svårt att tillhandahålla Imovane/Zopiklon på öppenvårdsapotek. Andra behandlingsalternativ kan behöva övervägas. Tänk på att abrupt utsättning av en längre tids regelbunden behandling med zopiklon kan orsaka utsättningssymtom. Se information FASS under rubriken "Varning och försiktighet". Patienter som har dosförpackade läkemedel (ApoDos) berörs ej i dagsläget. Om det blir aktuellt så kommer dosapoteket att kontakta förskrivande enhet.
Alternativ	Förslag på överväganden/alternativ till Imovane/Zopiklon: <ul style="list-style-type: none"> • Kan behandlingen avslutas? • Icke farmakologiska åtgärder? (Se mer information i broschyren Sov bra på intranätet.) • Kan zopiklon 3,75 mg vara tillräckligt? Generiskt zopiklon 7,5 mg är delbar i två lika stora doser – patienten behöver ett nytt recept. Eftersom tillgången på de mindre förpackningarna av zopiklon 7,5 mg är begränsad krävs att doseringstexten anger 0,5-1 tablett för att patienten ska kunna hämta ut 100 st zopiklon 7,5 mg inom läkemedelsförmånen. I undantagsfall kan apoteket expediera ett mindre antal tabletter ur en större förpackning. • Stilnoct (zolpidem). Zolpidem har en kortare halveringstid (2 timmar) jämfört med zopiklon (5-6 timmar) varför nattliga uppvaknanden kan uppkomma. Patienten bör inte uppmuntras att ta ytterligare en tablett under natten om detta händer pga. risk för hang over (dagsedation). • Propavan (propiomazin). Risk för hangover pga. den längre halveringstiden (8 timmar). Behöver tas minst 60 minuter innan sänggåendet. • Oxazepam. Om sömnbesvär med nattliga uppvaknanden kan oxazepam övervägas. Tas ca 1 timme innan sänggåendet. Längre halveringstid (10 timmar) än zopiklon varför hang over kan uppstå. 7,5 mg zopiklon ~10 mg oxazepam. <p>Se mer information i Bakgrundsmaterialet till rekommenderade läkemedel.</p>

Anna Lengstedt, klinisk farmaceut, Läkemedelssektionen/terapigrupp psykiatri
Peter Valverius, chefläkare psykiatri, ordförande terapigrupp psykiatri