



Alert – Fortsatt brist på piperacillin/tazobaktam

Det råder fortsatt brist på piperacillin/tazobaktam (pip/taz) i styrkan 4 g/0,5 g. Den har en tid ersatts med styrkan 2g/0,25 g, men där har viss bristsituation också uppstått. Preliminärt leveransdatum är v 33 (kan dock komma att ändras allt eftersom).

Bristsituationen beror på en explosion i en råvarufabrik 2017, vilket inneburit global brist på råvaran. Enligt Fresenius Kabi kan tillgängligheten av pip/taz förbli osäker och svajig ett tag framöver.

Sjukhusapoteket har tidigare skickat ut information om bristsituationen via mejl till klinikerna på Blekingesjukhuset. Där står det att en liten mängd pip/taz har samlats in på avdelning 61 som sparas till de patienter som verkligen måste få behandling med pip/taz. Vid ett sådant behov kan man höra av sig till avdelning 61 för diskussion.

Strama uppmanar till återhållsamhet av pip/taz och att övergå till peroral antibiotika där det är möjligt.

För information om lämpliga alternativ under pågående restsituation se informationen nedan som hämtats från [Alert - Brist på piperacillin/tazobaktam 2017](#)

Alternativ till piperacillin/tazobaktam

Piperacillin/tazobaktam kan i en bristsituation i många fall ersättas med andra antibiotikapreparat. Man bör dock undvika att rutinmässigt ersätta piperacillin/tazobaktam med meropenem eller andra karbapenemer. Diskutera frikostigt med infektionskonsult!

Förslag på alternativ behandling som kan övervägas:

Bukinfektion/peritonit där gallvägsfokus är osannolikt: cefotaxim + metronidazol

Bukinfektion med misstänkt gallvägsfokus: cefotaxim + metronidazol + ampicillin (för täckning av enterokocker)


Gynekologiska infektioner inklusive tubo-ovarialabscess: cefotaxim + metronidazol

Febril urinvägsinfektion hos njurtransplanterad: cefotaxim + ampicillin

Urosepsis: cefotaxim + aminoglykosid

Nosokomial pneumoni hos patient på vårdavdelning: cefotaxim oftast tillräckligt





Vid akut brist bör piperacillin-tazobaktam sparas till **allvarliga nosokomiala infektioner på IVA, bukinfektion med gallvägsfokus, infektion med pseudomonas eller ESBL-bildande bakterier** samt **neutropen feber** samt till **gravida och ammande**.

Vid frågor kontakta infektionskonsult på telefonnummer: 4430

Om piperacillin/tazobactam inte alls finns att tillgå kan piperacillin/tazobactam på licens eventuellt vara ett alternativ. För mer information kontakta BLS-apotek på telefonnummer 6622.

2018-07-13

Eva Lindqvist, överläkare infektionskliniken, Strama-Blekinge

Karin Andersson, leg Apotekare Läkemedelssektionen Patientsäkerhetsavdelningen, Strama-Blekinge

Erica Reimhagen, BLS apotek

Landstinget Blekinge



LANDSTINGET BLEKINGE