

Alert –

Risker med Alvedon 665 mg – även vid omedveten överdosering


Det har under den senaste tiden uppmärksammats i media att överdosering med Alvedon 665 mg kan leda till allvarlig leverskada. Det behöver inte vara avsiktlig överdosering, utan en något för hög dosering under några veckor kan leda till leverskada. Även inom Landstinget Blekinge har oavsiktlig överdosering inträffat. Beakta att den rekommenderade maxdosen för paracetamol är 3 g per dygn för äldre. Försiktighet med paracetamol vid leversjukdom och vid alkoholmissbruk.


Överdoseringsfall med Alvedon 665 mg med modifierad frisättning är oförutsägbara. Vid överdosering kan maximal plasmakoncentration komma senare än förväntat och höga koncentrationer kan, främst vid stora doser, kvarstå under flera dygn. Den sedvanliga provtagnings- och behandlingsregim som används vid förgiftningar med vanlig paracetamolberedningar är därför inte tillämplig. Information om detta finns på Giftinformationscentralens hemsida för läkare, www.giftinfo.se.

Förskrivningen av Alvedon 665 mg har under de senaste åren ökat i Blekinge. Alvedon 665 mg är utformad i två lager, varav 31 procent frisätts snabbt och resterande 69 procent långsamt. Tabletterna är större och svårare att svälja. Den kan inte delas eller krossas då frisättning och effekt påverkas.

Med bakgrund av ovanstående risker rekommenderas som alternativt förskrivning av Alvedon (paracetamol) 500 mg i första hand. Alvedon 665 mg kan om möjligt vara ett alternativ där 3-dosförfarande ger en väsentlig fördel för patienten, alternativt för att undvika störd nattsömn på grund av smärta. Det är viktigt med noggrann information till patienten gällande dosering och eventuell kombination med andra läkemedel som innehåller paracetamol.

FIGUR 4. Modifierad frisättning vs konventionell tablett





Figur 1: Bilden visar på hur komplicerad frisättningen av paracetamol med Alvedon 665 mg är jämfört med vanliga tabletter. Läkartidningen volym 114, 2017.

Läkemedelkommittén, Patientsäkerhetsavdelningen
Lena Olsson, klinisk farmaceut
Karin Andersson, leg Apotekare

Källor:

[Läkemedelsverket – Svårbehandlade förgiftningar med Alvedon 665 mg](#)

[Janusinfo- Använd depåberedning av paracetamol med försiktighet till äldre, 20170307](#)

[Läkartidningen volym 114, 2017](#)

[SPC Alvedon 665 mg - FASS.se](#)

[Rekommenderade läkemedel -bakgrundsmaterial 2017- Rörelseapparaten/smärta](#)

