

Rubrik: Rutin vaccination av barn med risk för anafylaktisk reaktion eller annat hinder för vaccination i skolans miljö	
Enhet/förvaltning: Region Blekinge -Vaccinationsstaben	Huvudområde/delområde:
Ansvarig: Vaccinsamordnare	Utfärdare: Vaccinsamordnare
Gemensamt med: Barnhälsovårdsöverläkare	Version: 2.0
Godkänt datum: 2021-11-17	Nästa revidering: 2021-12-31

Genomförande

Syftet med rutinen är att ge stöd och struktur till medarbetare som ska utföra vaccinationer av barn som tidigare haft en svår allergisk reaktion/anafylaxi mot vaccin eller annat injicerat läkemedel. Patientgruppen är liten och mycket få reaktioner är hittills konstaterade i Region Blekinge. Enligt *Svenska föreningen för allergologi* ska nämnda patientgrupp vaccineras på sjukhus. Vidare ska rutinen vara ett stöd för barn som av annan anledning inte kan vaccineras i skolmiljö t ex funktionsnedsättning.

Detaljer gällande genomförande samt kategorisering av allergier, se sida 2.

Inför vaccination

1. Vårdnadshavare som anser att barnet inte kan vaccineras i skolans miljö kontaktar sin vårdcentral för bedömning.
2. Om ordinator bedömer att barnet inte kan vaccineras i skolans miljö, kontaktar ordinator vårdnadshavare och informerar vårdnadshavare att de kontaktar sin vårdcentral för bedömning.
3. Om bedömningen innebär att vaccination ska utföras på barnkliniken kontaktar barnets ordinarie läkare barnkliniken.
4. Barnkliniken listar de patienter som är aktuella för vaccination på barnkliniken och kallar respektive patient när det är dags för vaccination.
5. Barnkliniken har dialog med vaccinationsstaben för planering av vaccinleverans för genomförande .

Nedan text framtagen av Sofia Hellerfelt, Barnläkare, Barn- och ungdomsallergolog

Covid-vaccination för barn med allergi:

Kategorier enligt Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA) riktlinjer:

[Riktlinjer-COVID-19-och-allergi-29-januari-2021.pdf \(sffa.nu\)](#)

- A. Sedvanlig anafylaxiberedskap vid vaccination, 15 min observation
- B. Anafylaxiberedskap samt möjlighet för akutbehandling, 30 min observation
- C. Vaccination på sjukhus eller specialistklinik med möjlighet till mera avancerad sjukvård vid behov (inklusive narkosberedskap).

Barn med allergi som kan vaccineras i skolan:

Kategori A

- Luftvägsallergi (pollen, pälsdjur, kvalster), även om kraftiga reaktioner.
- Urtikaria med eller utan quinckeödem (om ej associerat med reaktion från annat organsystem).
- Tidigare reaktion på födoämne som man nu tål och äter.
- Pågående hyposensbehandling och reaktioner (ej anafylaxi) vid hyposensbehandling (sk allergivaccination).

Barn som ska vaccineras på vårdcentral:

Kategori B

- Tidigare anafylaxi av födoämne, bi-getingstick, latex eller po läkemedel.
Med anafylaxi menas en systemreaktion som innefattar två eller fler organsystem (exempelvis generaliserad urtikaria *samt* bronkobstruktion och/eller blodtrycksfall och/eller upprepade kräkningar).
Tidigare anafylaxi vid hyposensbehandling.
- Barn som har adrenalinpenna utskriven pga allergi.

Barn som ska vaccineras på sjukhus/avstå vaccination:

Kategori C

- Anafylaxi av iv läkemedel eller vaccin, eller upprepade anafylaxi av okänd etiologi