

Rubrik: Rekommenderad smittskyddsrutin inom kommunal vård och omsorg i Blekinge	
Enhet/förvaltning: Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen	Huvudområde/delområde: Smittskydd
Ansvarig: Bengt Wittesjö	Utfärdare: Bengt Wittesjö
Gemensamt med: Blekinges region och kommuner	Version: 6.9 2023-03-06
Godkänt datum: 2020-07-14	Nästa revidering Vid behov

Den 1 april klassas covid-19 inte längre som allmän- eller samhällsfarlig sjukdom men är fortfarande smittspåringspliktig inom känsliga miljöer som vård och omsorg. Den som testar positivt för covid får inte längre några bindande förhållningsregler, dessa kommer istället att ersättas med rekommendationer ([Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen \(slf.se\)](#)) där skyddsplikten enligt smittskyddslagen (2 kap. 2§) betonas:

Den enskildes skyldighet att förebygga smittspridning

1 § Var och en skall genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

2 § Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk.

Indikation för testning (PCR) vid förkylningssymptom:

- Omsorgstagare på särskilt boende samt patienter med medicinsk indikation där läkare bedömer att diagnos har betydelse för den fortsatta handläggningen, t ex ovaccinerade (färre än 3 doser) eller patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar och negativ serologi trots vaccination. Provtas helst inom 3 dagar från symptomdebut inför beslut om ev virushämmande behandling.
- Förnyad provtagning vid förkylningssymptom är inte indicerat förrän det gått 3 månader från föregående PCR-verifierad sjukdom.

Bekräftade fall

Vid konstaterad covid 19 hos patient ska kohortvård tillämpas enligt de förutsättningar som är beslutade hos respektive vårdgivare.

I de fall transport av patient till utsett boende är nödvändig ska detta ske på ett säkert sätt där både patient och transportör använder gällande skyddsutrustning. Liggande transport kan tillämpas med hjälp av transportambulans.

Behandlande läkare (den som ordinerat provet) ansvarar för att:

- Meddela skyddsplikter (smittskyddsblad/patientinformation)
- Informera berörda verksamheter

- Läkarbilen informeras löpande om patienter med konstaterade covid 19 i kommunal regi.

Smittsamhet

Smittsamhet vid konstaterad smitta (oavsett vaccinationsstatus) bedöms som låg vid mer än 1 dygns feberfrihet och påtaglig allmän förbättring och minst 5 dagar sedan symtomdebut eller räknat från provtagningsdagen om personen haft en symptomfri infektion.

För patienter som vårdats på sjukhus samt omsorgstagare på särskilt boende gäller minst 7 dagar.

För personal är det fortfarande viktigt att stanna hemma vid förkylning så länge man känner sig sjuk, framför allt vid feber och hosta.

Screening

- Vid tecken på smittspridning inom verksamheten kan PCR-testning av övriga brukare övervägas efter beslut av ansvarig chef i samråd med MAS.
- Vid konstaterad smittspridning på sjukhusavdelning tas prov på vårdavdelningen vid utskrivning till särskilt boende under 5 dagar efter senast konstaterade fallet. Brukaren bör hållas isolerad på boendet tills provsvaret är klart.

Skyddsrutiner

- Munskydd klass IIR ska bäras kontinuerligt i gemensamma utrymmen på arbetsplatsen och vid all patient-/brukarkontakt vid en utbrottssituation av covid-19 som kan kopplas till verksamheten t o m dag 5 efter sista fallet. Kombineras med visir i omvårdnadssituationer samt åtgärder för att ge möjlighet för ökad fysisk distansering.
- Vid vård av patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19 gäller skyddsrutin enligt särskilt PM.
- Munskydd klass IIR rekommenderas vid patientnära vård av omsorgstagare med förkylningssymptom under de första fem dagarna.