

Åtgärder för att minska risken för smittspridning av luftvägsvirus inom hälso- och sjukvård – i personalgrupper och från personal till patienter

Enhet/förvaltning: Smittskydd Blekinge	Huvudområde/delområde:
Ansvarig: Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare	Utfärdare: Bengt Wittesjö
Gemensamt med:	Version: 4.7 2023-03-06
Godkänt datum: 2020-12-07	Nästa revidering: Vid behov

Covidpandemin är inte över men smittspridningen av olika luftvägsvirus ligger för närvarande på en relativt låg nivå. Vi kan därför lätta på source control i form av munskydd men måste vara beredda på att återinföra det vid tecken på ökad smittspridning. Samtidigt avskaffas hittills gällande besöksrestriktioner.

- Munskydd vid patientnära kontakt endast vid vård av patienter med **allvarlig immunbrist***.
- Munskydd ska bäras kontinuerligt på arbetsplatsen vid en utbrottssituation (två eller fler fall bland patienter som kan kopplas till verksamheten) t o m dag 5 efter sista fallet. Kombinerar med visir vid patientkontakt. Åtgärder vidtas för ökad möjlighet till fysisk distansering för personalen på arbetsplatsen.
- Munskydd byts mellan patienter (behöver dock inte bytas mellan patienter på samma vårdsal). Visiren hanteras på samma sätt dvs engångs slängs och flegångs desinficeras.

***Bedöms på verksamhets- och/eller individnivå av ansvarig läkare. Berör främst personer som i stor utsträckning utvecklar ett sämre immunsvår efter vaccination exv organ-/stamcellstransplanterade, CAR T-cellsbehandling, hematologiska maligniteter med aktiv behandling, immunmodulerande medicinering (t ex antiCD20) och primär immundefekt.**

Vid vård av patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19 gäller skyddsrutin enligt särskilt PM.