

Dokumentnamn: <b>Rutin allmän vaccination covid-19 Region Blekinge</b>		Senast reviderad: <b>2024-02-05</b>
Dokumenttyp: Rutin	Dokumentnummer:	
Detta dokument gäller för: Region Blekinge	Funktionsområde: Vaccinsamordning	
Dokumentansvarig: Vaccinsamordnare	Beslut av: Chefläkare Primärvård	
Beslut datum: 2021-01-14	Nästa revidering: 2025-02-28	

Erbjudande om vaccination mot covid-19 sker efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och prioriteringsordning.  
Olika fabrikat av vaccinet förekommer.

Läs igenom bipacksedel för det vaccin som ska administreras. Hållbarhet, beredning, tillvägagångssätt, biverkningar och annat som kan vara av betydelse skiljer sig mellan de olika fabrikaten.  
Vaccinatörerna ska hålla sig uppdaterade gällande restriktion och rekommendation för respektive vaccin.

Behöriga att ordinera läkemedel för vaccination mot covid-19 är läkare, distriktssjuksköterska och barnsjuksköterska samt efter bedömning av verksamhetschef sjuksköterska med likvärdig specialistutbildning, se [Socialstyrelsen länk; Senaste versionen av HSLF-FS 2020:81 Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19; - Socialstyrelsen](#)

### **Registrering**

Registrering av covid-19 vaccination sker enbart i MittVaccin enligt det arbetsflöde som är uppbyggt i journalstödet. Dokumentation görs i direkt samband med genomförandet av vaccinationen.

Framtagen Reservrutin vaccination covid-19, säsongsinfluensa och pneumokocker används vid eventuellt driftavbrott för MittVaccin. Länk; [Mitt vaccin - Region Blekinge](#)

***Denna reservrutin ska alltid finnas utskriven i pappersformat på vaccinationsmottagningarna!***

### **Vid ökad blödningstendens**

[Riktlinjer för vaccinationer hos patienter som behandlas med antitrombotiska läkemedel - Janusinfo.se](#)

### **Vid anafylaktisk reaktion**

Vid vaccination ska det vara möjligt att behandla anafylaxi i enlighet med läkemedelskommitténs rekommendationer.  
Symtom vid en anafylaktisk chock:

- Klåda eller svullnad i munhåla och svalg, klåda i handflator eller fotsulor
- Kraftig urtikaria
- Andningssvårigheter, pipande andning, astma eller kruppliknande hosta
- Buksmärter, illamående och kräkningar
- Dåsighet, omtöckning och allmänpåverkan

Tillkalla hjälp som ringer ambulans

Ge injektion adrenalin (0,3 - 0,5 mg) im i lårets utsida när symtom uppkommer. Adrenalinpenna kan användas genom kläder och ger effekt inom 5 minuter, upprepa vid behov var 10:e minut.

**Vid anafylaxi ska personen alltid akut till sjukhus.**

Rekommenderade läkemedel - Region Blekinge (Anafylaxibehandling)

**Rutin vaccination av patienter med risk för anafylaktisk reaktion**

Microsoft Word - Riktlinjer COVID-19 och allergi 1 december (sffa.nu)

## Arbetsgång

- Bokningsbara tider läggs upp i MittVaccin, alternativt drop in som meddelas till [kommunikationsbehov@regionblekinge.se](mailto:kommunikationsbehov@regionblekinge.se) för att de ska läggas upp på 1177.se under aktuell vårdcentral.
- Invånaren bokar tid i MittVaccin via 1177.se/blekinge eller via callback, alternativt dyker upp på drop in.
- ID-kontroll utförs vid vaccinationstillfället.
- Kontrollera med den som ska vaccineras om det saknas doser i MittVaccin. Om personen fått vaccin på annat håll ska detta dokumenteras i kommentarsfältet. Detta för att säkerställa att dokumentationen är korrekt samt för att underlätta vid kontroll av fella.
- I samband med vaccination ska ställningstagande kring vaccinationslämplighet göras av vaccinator utifrån uppgifter ifyllda på hälsodeklarationen. Kontrollera i MittVaccin aktuellt mobilnummer samt eventuellt mailadress till invånaren.
- Vaccinet administreras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (läkare eller sjuksköterska). Om vaccinatören (ssk) ej har ordinationsrätt ska ordination finnas i MittVaccin.
- Vaccinationsuppgifter samt kundgrupp registreras i MittVaccin i direkt samband med vaccination.