

# Uppdatering av centrala infektionsfavoriter enligt Antibiotikaval 2021-2023

# Sök med \*

- Sök fram favoriten med \* **sökord +alt och §** för bredare sökning än läkemedelsnamnet. För infektionsfavoriterna kan man tex söka på behandlingsorsaken för att hitta rätt favorit.

## \*erythema + alt och §

Favoritnamn		
*erythema		
<input checked="" type="checkbox"/> Centrala favoritpaket		
<input checked="" type="checkbox"/> Klinikunika favoritpaket		
<input checked="" type="checkbox"/> Centrala favoriter		
<input checked="" type="checkbox"/> Klinikunika favoriter		
<input checked="" type="checkbox"/> Personliga favoriter		
<input type="text" value="Sök"/>		
<b>☐ : Centrala favoriter</b>		
	Amimox (amoxicillin) Mixt 100mg/ml;15 mg/kg x 3 i 14d //<8år EM multipla, +feber,huvud/hals erythema	Multipla EM, EM + feber, EM i huv
	Doxycyklin (doxycyklin) T 100 mg 1x2 10 d //multipla EM,EM+feber,huvud/hals, erythema migrans//	.
	Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) Mixt 100 mg/ml, 25 mg/kg x 3 i 10d BARN/kattbett ErythemaM solitär	I favoriten används beräkningshjälp
	Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) T 1g 1x3 10 d /tonsillit,erysipelas,sår, ErythemaMsolitär kattbett	Favorit för: Tonsillit, erysepelas, En
	Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) T 1g 1x3 10 dagar BARN 35-40 kg //Erythema EM solitär kattbett	
	Vibranord (doxycyklin) mixtur 4 mg/kg x 1 i 14 d / >8 år /EM multipla,EM+feber, huvud/hals erythema	I favoriten används beräkningshjä

## \*cystit + alt och §

Sökurval	Paket	Favoritnamn /	Kommentarer
Favoritnamn			
*cystit			
<input checked="" type="checkbox"/> Centrala favoritpaket			
<input checked="" type="checkbox"/> Klinikunika favoritpaket			
<input checked="" type="checkbox"/> Centrala favoriter			
<input checked="" type="checkbox"/> Klinikunika favoriter			
<input checked="" type="checkbox"/> Personliga favoriter			
<input type="text" value="Sök"/>			
<b>☐ : Centrala favoriter</b>			
		Furadantin (nitrofurantoin) T 5 mg, 1,5 mg/kg x 2 i 5 dagar //cystit afebril UVI BARN 2-5 år	I favoriten används beräkningshjälp. Avrunda till närmaste hela tablett.
		Furadantin (nitrofurantoin) T 50 mg 1x3, 5 dagar //cystit afebril UVI kvinna, ABU gravid//	Saknar effekt vid GFR under 40 ml/min.
		Furadantin (nitrofurantoin) T 50 mg 1x3, 7 dagar //cystit afebril UVI man//	Saknar effekt vid GFR under 40 ml/min.
		Selexid (pivmecillinam) T 200 mg 1x3 5 d /cystit afebril UVI kvinna postmenopausal, gravid, barn>5 år	Kvinna: postmenopausal, Cystit/ABU gravid, barn> 5 år
		Selexid (pivmecillinam) T 200 mg 1x3, 7 dagar // cystit afebril UVI Man //	.
		Selexid (pivmecillinam) T 400 mg; 1x2 i 3 dagar //cystit afebril UVI kvinna premenopausal //	Ett doseringsalternativ i Antibiotikaval 2021 för premenopausal kvinnor.

# Barnfavoriter med beräkningshjälpen

- För mer exakt dosering
- Favoriterna som utgår från viktintervall (tex 10-20 kg) kommer tas bort runt årsskiftet.

## 1. Välj favorit

Favoritnamn /	Kommentarer
<b>avoriter</b>	
Kåvepenin (fenoximetylpencillin) Mixt 100 mg/ml, 12,5 mg/kg x 3, 10 dagar // tonsillit//	I favoriten används beräkninghjälpen. Avrunda uppåt till halva eller hela ml. 60 ml om vikt under 15 kg. Till barn under 10 kg kan Kåve
Kåvepenin (fenoximetylpencillin) Mixt 100 mg/ml, 20 mg/kg x 3, 7 dagar < 5 år // pneumoni //	I favoriten används beräkninghjälpen. Avrunda uppåt till halva eller hela ml. 60 ml om vikt under 12 kg. OBS anger att rekommendero
Kåvepenin (fenoximetylpencillin) Mixt 100 mg/ml, 25 mg/kg x 3, 10 dagar //kattbett, EM solitär //	I favoriten används beräkninghjälpen. Avrunda uppåt till halva eller hela ml. 125ml om vikt under 15kg.
Kåvepenin (fenoximetylpencillin) Mixt 100 mg/ml, 25 mg/kg x 3, 5 dagar // akut mediaotit AOM //	I favoriten används beräkninghjälpen. Avrunda uppåt till halva eller hela ml. Använd 60 ml om vikt under 15kg.
Kåvepenin (fenoximetylpencillin) Mixt 50 mg/ml, 12,5 mg/kg x 3, 10 dagar //tonsillit// Barn < 10 kg	I favoriten används beräkninghjälpen. Avrunda uppåt till halva eller hela ml. Denna favorit (med styrkan 50 mg/ml) används till barn u

## 2. Skriv in vikt

Beräkningshjälp 19121212+ AA1B Test Bms, Test

Ålder 108 år

Beräkningsformel

Kroppsvikt  Kroppsyta  Dos

Vikt

Ordningsvikt  kg  Kommentar  Uppmätt vikt  kg

Längd

Längd  cm

Beräkning

Dygnsdos   Fördela på  tillfällen

Dos  mg/kg  vid  tillfällen per dygn

### 3. Kolla doseringen (är den hanterbar?)

Beräkningshjälp 19121212+AA1B Test Bms, Test

Ålder 108 år

Beräkningsformel  
 Kroppsvikt  Kroppsyta  Dos

Vikt  
Ordnationsvikt  kg  Kommentar  Uppmätt vikt  kg   
Längd  
Längd  cm

Beräkning  
 Dygnsdos   Fördela på  tillfällen  
 Dos  mg/kg vid  tillfällen per dygn

Till receptdialogen  
Doseringsenhet

Dosering	Enhet	Motsvarar
<input type="text" value="4,25+4,25+4,25"/>	ml	425+425+425 mg

Beräkningsresultat

Ordnation av	Dos (styrka)	Dos (mängd)	Dygnsdos (styrka)	Dygnsdos (mängd)	Dos/kg	Dygnsdos/kg
Kävepenin Granulat till oral suspension 100 mg/ml	425+425+425 mg	<input type="text" value="4,25+4,25+4,25 ml"/>	1275 mg	12,75 ml	25+25+25 mg/kg	75 mg/kg

### 4. Anpassa doseringen vid behov (avrunda uppåt till halva eller hela ml) + tryck OK

Beräkningshjälp 19121212+AA1B Test Bms, Test

Ålder 108 år

Beräkningsformel  
 Kroppsvikt  Kroppsyta  Dos

Vikt  
Ordnationsvikt  kg  Kommentar  Uppmätt vikt  kg   
Längd  
Längd  cm

Beräkning  
 Dygnsdos   Fördela på  tillfällen  
 Dos  mg/kg vid  tillfällen per dygn

Till receptdialogen  
Doseringsenhet

Dosering	Enhet	Motsvarar
<input type="text" value="4,5+4,5+4,5"/>	ml	450+450+450 mg

Beräkningsresultat

Ordnation av	Dos (styrka)	Dos (mängd)	Dygnsdos (styrka)	Dygnsdos (mängd)	Dos/kg	Dygnsdos/kg
Kävepenin Granulat till oral suspension 100 mg/ml	450+450+450 mg	<input type="text" value="4,5+4,5+4,5 ml"/>	1350 mg	13,5 ml	26,47+26,47+26,47 mg/kg	79,41 mg/kg

# 5. Fyll i doseringen i doseringsanvisningen (ersätt frågetecknet)

Nytt Recept 19121212+AA1B Test Bms, Test

Förnya Utsätt Dosändra Tillf. utsätt Återinsätt Reg. recept Makulera

Läkemedel

Godkända läkemedel  Icke godkända läkemedel Favorit \$ **Bek Örd** Läkem/subst Utbytbar FASS

Läkemedel Kåvepenin

Form Granulat till oral suspension Antal Förpackning Förp. typ

Styrka 100 mg/ml 1 200 milliliter Flaska, 200 ml

Förpackning 200 milliliter

Förp. typ Flaska, 200 ml Ändra förp. Ta bort förp.

Patienten är förmånsberättigad Ja Antal 1

Dosering/ordination

Behandlingsorsak **Ändra orsak**

Dosering 4,5+4,5+4,5 ml  Vid Behov Beräkn.hjälp

Doseringsanvisning ? ml 3 gånger dagligen i 10 dagar.  Smittskyddsläkemedel

Begränsad förmån

Villkor uppfyllda  Ja  Nej

Behandlingsändamål

Behandlingsstart 211025

Insätt 211025 Behandl. tid i dagar 10 Behandlingslut 211104  Tillsv vidare

Första uttag före

Administration

Antal expeditionstillfällen 1 Exp. Intervall  Månad  Vecka  Dag

Generikabyte ej tillåtet  Startförpackning

Särskild receptblankett

Pris 267,79

Spara Spara #Fler Interaktionskontroll (C) Avbryt

# OBS- när doseringen skiljer sig från FASS

- OBS (fd SIC) i antibiotikaval och favoriter (doseringsanvisningen)

Läkemedel

Godkända läkemedel  Igke godkända läkemedel Favorit \$ **Beh.Ord** Läkem/subst Utbytbar FASS

Läkemedel Kåvepenin

Form Granulat till oral suspension Antal Förpackning Förp. typ

Stycka 100 mg/ml 1 125 milliliter Flaska, 125 ml

Förpackning 125 milliliter

Förp. typ Flaska, 125 ml Ändra förp. Ta bort förp.

Patienten är förmånsberättigad Ja Antal 1

Dosering/ordination

Behandlingsorsak bakteriell pneumoni **Ändra orsak**

Dosering 3+3+3 ml  Vid Behov **Beräkn. hjälp**

Doseringsanvisning 3 ml 3 gånger dagligen i 7 dagar. **OBS**  Smittskyddsläkemedel

Begränsad förmån

Villkor uppfyllda  Ja  Nej

Behandlingsändamål Mot lunginflammation

Behandlingsstart 211025

## Pneumoni - barn

**Diagnos:** Påverkat barn med feber. Takypné: > 50/min hos barn < 1 år, > 40/min hos barn > 1 år. Ibland hosta. CRP bör användas sparsamt men kan ge stöd i tveksamma fall. CRP > 80 mg/l kan tala för pneumoni.

**Allvarighetsbedömning:** Indragningar, dåligt dryckesintag och minskad urinproduktion talar för svår pneumoni – överväg sjukhusvård. Bedömning av allmäntillståndet är dock det viktigaste!

## Förstahandsval

Barn < 5 år:

### fenoximetylpenicillin

(PcV)	Kåvepenin	<b>20 mg/kg x 3</b>	7 dagar	oral lösning	<b>OBS*</b>
	amoxicillin	Amoxicillin	15 mg/kg x 3	5 dagar	oral lösning

Barn > 5 år:

### fenoximetylpenicillin

(PcV)	Kåvepenin	12,5 mg/kg x 3	7 dagar	tablett
-------	-----------	----------------	---------	---------

## Kontakt:

- Vid frågor, förslag eller feedback angående de centrala receptfavoriterna (öppenvård) kontakta samordnare Karin Andersson farmaceut på Enheten för Kvalité- och utvecklingsavdelningen (ersätts under föräldraledighet med start 17/2- 2022 av Anna Lengstedt klinisk farmaceut på samma enhet).
- För centrala ordinationsfavoriter (utom de märkta IVA eller BARN IVA) i slutenvården kontakta Britt-Marie Schuhmeier, farmaceut på BLS Apotek.
- För frågor av mer teknisk karaktär om favoriterna kontakta Förvaltning vårdssystem.



REGION  
BLEKINGE