

Preparat	Form, Styrka	Indikation	Biverkningar
Postafen (meklozin; antihistamin)	Tablett 25 mg	Postoperativt illamående, illamående vid rörelsesjuka och graviditet.	Sedering, muntorrhet. Torrhet i svalg och näsa.
Primperan (metoklopramid; dopaminreceptorantagonist) Obs Ny maxdos 10 mgx3	Tablett 10 mg	Nedsatt motilitet i gastrointestinalkanalen Illamående vid akut migrän Cytostatikakomplikation	Extrapyramidala symptom. Ökad risk hos äldre/hög dos. Trötthet.
Ondansetron (ondansetron; 5H3-receptorantagonist)	Tablett 4 mg alt 8 mg	Akut illamående (sämre vid fördröjt illamående) Cytostatikakomplikation postoperativt illamående Kan med fördel kombineras med kortikosteroider vid cytostatikabehandling	Obstipation, huvudvärk

Val av antiemetikum grundas på anamnes – möjligt orsakssamband (gastrointestinal störning/central eller perifer neurogen genes/läkemedelsbiverkan). Biverkningsprofilen bör beaktas inte minst vid behandling av äldre personer.

Vid illamående vid graviditet kan i första hand Postafen och i andra hand LergiganComp användas.